

# LES FONCTIONS : LIMITES ET CONTINUITÉ

## Objectifs

- Connaître les réels.
- Connaître et manipuler la valeur absolue
- Connaître les définitions de limites
- Savoir calculer des limites
- Connaître la notion de continuité

## 1 L'ensemble des réels

### 1.1 Les sous-ensembles de $\mathbb{R}$

**Exemple 1.** Qu'est ce qu'un nombre ?

#### Définition 1.

On distingue plusieurs sous-ensembles de l'ensemble des réels.

- L'ensemble des entiers naturels, noté  $\mathbb{N}$ .
- L'ensemble des entiers relatifs, noté  $\mathbb{Z}$ .
- L'ensemble des nombres décimaux (Nombre fini de chiffre après la virgule dans l'écriture décimale),  $\mathbb{D}$ .
- L'ensemble des nombres rationnels (Quotient de deux entiers relatifs), noté  $\mathbb{Q}$ . La partie décimale d'un nombre rationnel est périodique à partir d'un certain rang.
- L'ensemble des irrationnels (Les réels non rationnels).

### 1.2 La valeur absolue

#### Définition 2.

Soit  $x$  un réel. La valeur absolue de  $x$  est notée  $|x|$ , et l'on a :  
 $|x| = x$  si  $x$  est positif,  $|x| = -x$  sinon.

#### Exemple 2.

Écrire sans valeur absolue  $\left| \frac{\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2} - 3} \right|$ .

#### Propriété 1.

- $|-x| = |x|$
- Inégalités triangulaires :  $||a| - |b|| \leq |a + b| \leq |a| + |b|$

- $\sqrt{x^2} = |x|$

**Exemple 3.**

Donner des exemples où les inégalités sont strictes, et où l'on a l'égalité dans les inégalités triangulaires.

La valeur absolue est souvent utilisée pour caractériser les réels appartenant à un intervalle, grâce à la propriété suivante :

**Propriété 2.**

Soit  $x, a$  deux réels et  $\varepsilon$  un réel strictement positif.

- $|x - a| = \text{distance}(a; x)$
- $|x - a| \leq \varepsilon \iff x \in [a - \varepsilon; a + \varepsilon]$

**Exemple 4.**

Représenter sur un axe les assertions précédentes.

## 2 Introduction à la notion de limite sur un exemple provenant de la physique

### 2.1 L'exemple : la force d'attraction gravitationnelle

Dans la théorie Newtonienne, la valeur de la force d'attraction gravitationnelle entre deux points  $A$  et  $B$  a pour valeur

$$F_{AB} = G \frac{m_A m_B}{d^2}$$

où  $m_A$  et  $m_B$  sont respectivement les masses des points  $A$  et  $B$ ,  $d$  est la distance entre les points  $A$  et  $B$ , et où  $G$  est une constante.

### 2.2 Grandeurs, variables et fonctions

Nous voyons dans l'égalité de l'exemple précédent, plusieurs lettres qui peuvent être interprétées de plusieurs façons suivant le contexte.

On peut par exemple utiliser cette formule uniquement d'un point de vue numérique, c'est à dire que l'on calcule une des valeurs à partir des autres :

On peut aussi considérer que la force  $F$  dépend des trois autres grandeurs. En mathématiques, on dira que  $F$  est une **fonction** à trois **variables** :  $m_A, m_B$  et  $d$ .

On peut aussi fixer deux des trois grandeurs, par exemple  $m_A$  et  $m_B$ .  $F$  sera alors une fonction à une variable, la variable  $d$ , et  $m_A$  et  $m_B$  seront appelées des **constantes**.

**Exemple 5.**

Comment note-on, en mathématiques, l'image de  $d$  par  $F$ ? Comment s'appelle  $d$  par rapport à  $G \frac{m_A m_B}{d^2}$  ?

## 2.3 Ensemble de définition

Puisque l'on veut étudier le comportement de  $F$  en fonction de  $d$ , il faut connaître les valeurs possibles pour  $d$ . Cet ensemble est appelé **ensemble de définition** de la fonction  $F$ . Ici  $d$  peut prendre n'importe quelle valeur strictement positive, l'ensemble de définition de la fonction  $F$  est donc égal à  $]0; +\infty[$ .

### Remarque 1.

Si la fonction  $F$  était donnée en dehors du contexte physique par  $F(x) = G \frac{m_A m_B}{x^2}$ , le domaine de définition de  $F$  serait  $\mathbb{R}^*$ . Le domaine de définition est donc différent selon que l'on considère la fonction dans un contexte de physique ou en mathématiques.

### Exemple 6.

Donner le domaine de définition de la fonction  $f$  définie par  $f(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 - 1}$

## 2.4 Limite de $F$ lorsque la variable tend vers un réel

On ne peut pas calculer  $F$  pour  $d = 0$ , mais on peut calculer  $F$  pour des valeurs de  $d$  très proches de 0. En mathématiques,  $d$  peut être aussi proche que l'on veut de 0.

### Exemple 7.

Que peut-on dire de  $F(d)$  lorsque  $d$  s'approche aussi près que l'on veut de 0? Que pensez vous du résultat du point de vue physique?

## 2.5 Limite de $F$ lorsque la variable tend vers $+\infty$

On peut aussi regarder les valeurs de  $F(d)$  lorsque  $d$  prend des valeurs aussi grandes que l'on veut.

### Exemple 8.

Que peut-on dire de  $F(d)$  lorsque  $d$  prend des valeurs aussi grandes que l'on veut? Que pensez vous du résultat du point de vue physique?

# 3 Opérations sur les limites

$a$  est un réel ou l'infini.

## 3.1 Limite d'une somme

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) =$$

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) =$	$l \in \mathbb{R}$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} g(x) =$			
$m \in \mathbb{R}$			
$+\infty$			
$-\infty$			

0. FI = Forme Indéterminée, c'est à dire que l'on ne peut rien dire à l'avance, tous les cas sont possibles

### 3.2 Limite d'un produit

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) =$$

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) =$	$l > 0$	$l < 0$	0	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} g(x) =$					
$m > 0$					
$m < 0$					
0					
$+\infty$					
$-\infty$					

### 3.3 Limite d'un quotient

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} =$$

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) =$	$l > 0$	$l < 0$	0	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} g(x) =$					
$m > 0$					
$m < 0$					
$0^+$					
$0^-$					
$\pm\infty$					

#### Exemple 9.

Donner un exemple de forme indéterminée dans chacun des cas précédents.

### 3.4 Limite d'une composée de fonctions

#### Définition 3.

Soit  $f$  une fonction définie sur un ensemble  $I$  et  $g$  une fonction définie sur  $f(I)$ . Alors  $g \circ f$  est la fonction définie sur  $I$  par  $g \circ f(x) = g(f(x))$  pour tout  $x \in I$ .

#### Exemple 10.

- Déterminer  $f \circ g$  et  $g \circ f$  avec  $f(x) = x + 3$  et  $g(x) = x^2 - 1$ .
- Déterminer deux fonctions  $f$  et  $g$  telles que  $h = f \circ g$  avec  $h(x) = \sqrt{x^4 + 2x^2 + 1}$ .

#### Théorème 1.

Soient  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  et  $g : J \rightarrow \mathbb{R}$  telles que  $f(I) \subset J$  de sorte que la composée  $g \circ f$  ait un sens.

- Si  $f$  possède une limite (finie ou infinie)  $b$  en  $a$  alors  $b$  est un élément ou une borne de  $J$

2. Si de plus  $g$  possède une limite (finie ou infinie)  $l$  en  $b$ , alors  $g \circ f$  admet la limite  $l$  en  $a$  :

$$\left\{ \begin{array}{l} f(x) \rightarrow b \\ g(x) \xrightarrow{x \rightarrow b} l \end{array} \right. \Rightarrow g(f(x)) \xrightarrow{x \rightarrow a} l$$

**Exemple 11.**

Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left( 1 + \frac{1}{x} \right)$

### 3.5 Limites d'un polynôme et d'une fraction rationnelle en l'infini

**Théorème 2.**

La limite en  $\pm\infty$  d'une fonction polynomiale  $P$ , c'est à dire une fonction qui à tout  $x$  associe un polynôme, soit  $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$  est égale à la limite en  $\pm\infty$  du terme de plus haut degré de  $P$  soit  $a_n x^n$ , c'est à dire que l'on a :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n$$

**Exemple 12.** Déterminer la limite de  $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$  en  $-\infty$ .

**Théorème 3.**

La limite en  $\pm\infty$  d'une fonction rationnelle  $Q$ , c'est à dire une fonction qui à tout  $x$  associe le quotient de 2 polynôme, soit  $Q(x) = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0}$  est égale à la limite en  $\pm\infty$  du quotient des termes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur de  $Q$ , c'est à dire que l'on a :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m}$$

**Exemple 13.**

Déterminer la limite de  $f(x) = \frac{2x^2 + 3x - 1}{5x^2 - x + 3}$  en  $-\infty$ .

### 3.6 Limite avec les fonctions racines carrées

Il y a deux exemples types à connaître :

- Forme indéterminée en  $+\infty$  de la forme  $\frac{\sqrt{x+3}}{\sqrt{x-4}}$  : on factorise par  $\sqrt{x}$  le numérateur et le dénominateur.
- Forme indéterminée de la forme  $\sqrt{x+3} - \sqrt{x+7}$  : on multiplie et on divise par la quantité conjuguée  $\sqrt{x+3} + \sqrt{x+7}$ .

**Exemple 14.**

Justifier que les deux exemples types précédents sont bien des formes indéterminées puis calculer les limites en  $+\infty$  à l'aide de la méthode proposée.

## 4 Limites et inégalités

### 4.1 Théorèmes

$a$  est soit un réel soit l'infini.

**Théorème 4.** *Passage des inégalités larges à la limite*

Soient  $f, g$  deux fonctions de  $I$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  et  $g$  admettent toutes deux des limites finies  $l$  et  $m$  en  $a$  et que  $f \leq g$  au voisinage de  $a$  alors :  $l \leq m$

**Exemple 15.**

Si l'on a  $f, g$  deux fonctions de  $I$  dans  $\mathbb{R}$  telles que  $f$  et  $g$  admettent toutes deux des limites finies  $l$  et  $m$  en  $a$  et que  $f < g$  au voisinage de  $a$  alors a t-on :  $l < m$  ?

**Théorème 5.** *Théorème des Gendarmes*

Soient  $f, g, h$  trois fonctions de  $I$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que :  $\left\{ \begin{array}{l} f(x) \rightarrow l \\ h(x) \rightarrow l \end{array} \right._{x \rightarrow a}$  et  $f \leq g \leq h$  au voisinage de  $a$ , alors  $g(x) \rightarrow l$   
 $_{x \rightarrow a}$

**Exemple 16.** Déterminer la limite en  $+\infty$  de  $\frac{\cos x}{x}$

**Propriété 3.**

1. Soient  $f, g$  deux fonctions de  $I$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose  $f(x) \rightarrow +\infty$  et  $f \leq g$  au voisinage de  $a$ , alors  $g(x) \rightarrow +\infty$   
 $_{x \rightarrow a}$
2. Soient  $f, g$  deux fonctions de  $I$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose  $g(x) \rightarrow -\infty$  et  $f \leq g$  au voisinage de  $a$ , alors  $f(x) \rightarrow -\infty$   
 $_{x \rightarrow a}$

**Exemple 17.**

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x + \cos x$ . Que vaut :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  ?

## 5 Théorème de la limite monotone

**Théorème 6.**

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I = ]a; b[$ , avec  $a$  et  $b$  dans  $\mathbb{R} \cup \{-\infty; +\infty\}$ . Si  $f$  est monotone sur  $I$ , alors elle admet une limite finie ou infinie en  $a$  et en  $b$ .

**Exemple 18.**

1. Que peut-on dire de la limite d'une fonction  $f$  dans les cas suivants :
  - (a)  $f$  est strictement croissante ?
  - (b)  $f$  est majorée ?
2. Quelle(s) condition(s) suffisante(s) doit-on avoir sur  $f$  pour que  $f$  admette une limite finie ? Ces conditions sont-elles des conditions nécessaires ?

## 6 Quantificateurs

### 6.1 Quantificateur universel $\forall$

" $\forall x \in E$ " signifie : " pour tout élément  $x$  de  $E$ ".

#### Exemple 19.

Écrire avec des symboles mathématiques : " le carré d'un nombre réel est toujours positif".

### 6.2 Quantificateur existentiel $\exists$ et $\exists!$

- " $\exists x \in E$ " signifie : " il existe au moins un élément  $x$  de  $E$ ".
- " $/$ ", " $:$ ", " $,$ ", " $|$ " ou espace signifie : " tel que".
- " $\exists!$ ", signifie il existe un unique....

#### Exemple 20.

Écrire uniquement avec des symboles mathématiques :

" L'équation  $2x^2 - x = 0$  admet une solution entière."

" 1 admet un unique antécédent par la fonction  $\ln$ ."

### 6.3 Négation des quantificateurs

#### Théorème 7.

1. non  $(\forall x \in E \ P(x)) \Leftrightarrow (\exists x \in E / \text{non } P(x))$
2. non  $(\exists x \in E / P(x)) \Leftrightarrow (\forall x \in E \ \text{non } P(x))$

#### Exemple 21.

Écrire la négation des propositions suivantes :

P :  $\exists x \in \mathbb{R} : f(x) = 3$ .

Q :  $\forall y \in \mathbb{R} \ f(y)$  est un entier

R :  $\forall y \in F \ \exists x \in E / f(x) = y$

## 7 Définition de la notion de limite

Dans tout ce paragraphe, on considère une fonction  $f$  d'un intervalle  $I$  dans  $\mathbb{R}$ .  
 $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$

### 7.1 Limite finie en $a$


#### Définition 4.

Soit  $l \in \mathbb{R}$ .

Notation :  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$  ou  $f(x) \rightarrow l$ , se lit : " $f$  admet  $l$  pour limite en  $a$ ".

1. Cas où  $a \in \mathbb{R}$  : on dit que  $f$  admet  $l$  pour limite en  $a$  si et seulement si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in I \setminus \{a\}, |x - a| \leq \alpha \Rightarrow |f(x) - l| \leq \varepsilon$$



**Exemple 22.** Écrire, en symboles mathématiques, que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq l$ .

2. Cas où  $a = +\infty$  : on dit que  $f$  admet  $l$  pour limite en  $+\infty$  si et seulement si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists A \in \mathbb{R}, \forall x \in I, x \geq A \Rightarrow |f(x) - l| \leq \varepsilon$$

3. Cas où  $a = -\infty$  : on dit que  $f$  admet  $l$  pour limite en  $-\infty$  si et seulement si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists A \in \mathbb{R}, \forall x \in I, x \leq A \Rightarrow |f(x) - l| \leq \varepsilon$$

Intuitivement, l'assertion  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$  a la signification suivante : quelque soit  $\varepsilon > 0$ , pour que  $f(x)$  soit à distance  $\leq \varepsilon$  de  $l$ , il suffit que  $x$  soit suffisamment voisin de  $a$ . Toutefois, il faut faire attention : cette formulation dissimule l'idée importante de la définition à savoir que le voisinage en question dépend de  $\varepsilon$ .

**Théorème 8. Unicité de la limite**

Soient  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction et soit  $l$  et  $l'$  deux réels. On suppose que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$  et  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l'$ . Alors  $l = l'$ .

**Remarque 2.** La limite en un réel  $a$  est unique mais elle n'est pas forcément égale à  $f(a)$ .

**7.2 Limite infinie en a**

Dans ce paragraphe,  $a$  est une extrémité finie ou infinie de l'intervalle  $I$ .

**Définition 5.**

Soient  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction.

1. Cas où  $a \in \mathbb{R}$  : on dit que  $f$  admet  $+\infty$  (respectivement  $-\infty$ ) pour limite en  $a$  si et seulement si :

$$\forall B \in \mathbb{R}, \exists \alpha > 0, \forall x \in I \setminus \{a\}, |x - a| \leq \alpha \Rightarrow f(x) \geq B \text{ (respectivement, } f(x) \leq B)$$

2. Cas où  $a = +\infty$  : on dit que  $f$  admet  $+\infty$  (respectivement  $-\infty$ ) pour limite en  $+\infty$  si et seulement si :

$$\forall B \in \mathbb{R}, \exists A \in \mathbb{R}, \forall x \in I, x \geq A \Rightarrow f(x) \geq B \text{ (respectivement, } f(x) \leq B)$$

3. Cas où  $a = -\infty$  : on dit que  $f$  admet  $+\infty$  (respectivement  $-\infty$ ) pour limite en  $-\infty$  si et seulement si :

$$\forall B \in \mathbb{R}, \exists A \in \mathbb{R}, \forall x \in I, x \leq A \Rightarrow f(x) \geq B \text{ (respectivement, } f(x) \leq B)$$

On note :  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$  respectivement  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$

**Exemple 23.**

Soit  $f$  une fonction définie sur  $\mathbb{R}$  et soit  $a$  un réel. Représenter une fonction  $f$  vérifiant la propriété suivante :

$$\exists \alpha \in \mathbb{R} : \forall \varepsilon > 0, |x - a| < \alpha \implies |f(x) - l| \leq \varepsilon$$

## 7.2.1 Limite à droite, limite à gauche

### Définition 6. Limite à gauche

On suppose que  $x_0$  n'est pas la borne gauche de  $I$ . Si on étudie les valeurs de  $f(x)$  uniquement pour  $x < x_0$  et  $x \in I$  alors on dit qu'on étudie la limite à gauche de  $f$  en  $x_0$  et on note :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x) \text{ ou } \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$$

**Exemple 24.** Déterminer  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x}$

### Définition 7. Limite à droite

On suppose que  $x_0$  n'est pas la borne droite de  $I$ . Si on étudie les valeurs de  $f(x)$  uniquement pour  $x > x_0$  et  $x \in I$  alors on dit qu'on étudie la limite à droite de  $f$  en  $x_0$  et on note :  $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x)$

ou  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$

**Exemple 25.** Déterminer  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$

**Propriété 4.** On suppose que  $x_0$  est un élément de  $I$  distinct des bornes de  $I$ . Alors  $f$  admet une limite en  $x_0$  si et seulement si la limite à droite est égale à la limite à gauche. La limite de  $f$  en  $x_0$  est alors égale à la limite à droite ou à gauche en  $x_0$ .

### Remarque 3.

Si  $x_0$  est une des bornes de  $I$  alors :

- Si  $I = ]x_0; \dots$  ou  $I = [x_0; \dots$  alors  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ .
- Si  $I = \dots; x_0[$  ou  $I = \dots; x_0]$  alors  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ .

**Exemple 26.** On considère la fonction :  $\delta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   

$$x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x = 0 \\ \frac{|x|}{x} & \text{si } x \neq 0 \end{cases}$$

$\delta$  admet-elle une limite en 0 ?

## 8 Continuité

### 8.1 Fonction continue

On étudie ici la limite d'une fonction en un point où elle est définie

#### Définition 8.

Soient  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction.

1. Soit  $x_0 \in I$ .  $f$  est continue en  $x_0$  signifie que :

- $f$  admet une limite finie en  $x_0$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

Si une de ces deux conditions n'est pas réalisée, on dit que  $f$  est discontinue en  $x_0$ .

2. On dit que  $f$  est continue sur  $I$  si et seulement si elle est continue en tout point  $x_0$  de  $I$ .

**Exemple 27.**

La fonction  $\delta$  définie dans l'exemple 26 est elle continue en 0 ?

**Propriété 5.**

Si  $f$  est continue en  $a$  et si  $g$  est continue en  $f(a)$  alors  $g \circ f$  est continue en  $a$

**Exemple 28.**

Soit  $f$  la fonction définie par  $f(x) = \ln(\sqrt{x} + 1)$ .  $f$  est-elle continue en 0 ?

**Propriété 6.**

Soit  $f$  une fonction définie comme opérations de fonctions usuelles (sin, cos, fonctions rationnelles...). alors  $f$  est continue sur son domaine de définition.

**Remarque 4.**

Pour étudier la continuité d'une fonction sur un ensemble, on utilise la propriété précédente sur l'ensemble où  $f$  une fonction définie comme opérations de fonctions usuelles, et on utilise la définition 8 pour les autres réels.

**Exemple 29.**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$\begin{cases} f(0) = 2 \\ f(x) = \frac{\sin(x)}{x} \quad \text{si } x \neq 0 \end{cases}$$

La fonction  $f$  est-elle continue sur  $\mathbb{R}$  ?

## 8.2 Prolongement par continuité

**Définition 9.**

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle ouvert  $I$ , et soit  $a$  une borne de  $I$ . Si  $f$  admet une limite  $l$  en  $a$ , on dit que l'on **prolonge  $f$  par continuité en  $a$**  en posant  $f(a) = l$ .

**Exemple 30.**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $]0; +\infty[$  par :

$$f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$$

Peut-on prolonger  $f$  en 0 ?

### 8.3 Image d'un intervalle par une fonction continue

**Définition 10.**

Soit  $I$  un sous ensemble de  $\mathbb{R}$ . L'image de  $I$  par  $f$  est l'ensemble de tous les réels  $f(x)$  où  $x \in I$ . On note cet ensemble  $f(I)$  et on a donc  $f(I) = \{f(x)/x \in I\}$

**Exemple 31.**

Déterminer  $f(I)$  avec  $I = [-1; 3]$  et  $f$  la fonction carrée.

**Propriété 7.**

L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.

**Exemple 32.**

Donner l'image de  $[\frac{\pi}{4}; \frac{7\pi}{4}]$  par la fonction sinus.

**Propriété 8.**

Soit  $f$  une fonction continue sur un intervalle  $[a; b]$

Si  $f$  est croissante, l'image de  $[a, b]$  par  $f$  est  $[f(a); f(b)]$ .

Si  $f$  est décroissante, l'image de  $]a, b]$  par  $f$  est  $[f(b); f(a)[$ .

**Exemple 33.**

Montrer que si  $f$  est continue et non monotone la propriété précédente est fausse.

**Remarque 5.**

- Si  $f$  est définie sur  $]a; b]$  et  $f$  admet une limite en  $a$ , alors on remplace  $f(a)$  par  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ .
- La propriété précédente peut aussi être appliquée à tout type d'intervalle.

## Exercices

### Exercice 1.

Développer les expressions suivantes :

1.  $(x - 1)(x + 2) - x(x - 1)$
2.  $(a - b)(a + b)$
3.  $(-3x - 1)^2$

### Exercice 2.

factoriser les expressions suivantes :

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. $2x^3 - 5x^2$                        | 5. $3a^2b + ab - 4ab^2$ |
| 2. $x^2 - 1 + (3x - 2)(x + 1)$          | 6. $x^n + nx^{2n}$      |
| 3. $(x - 1)(3x + 2) + (5x - 3)(-x + 1)$ | 7. $2^n + 8^n$          |
| 4. $2np - px + p$                       |                         |

### Exercice 3.

Réduire les fractions suivantes :

- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. $\frac{3x + 2}{6x + 4}$    | 5. $\frac{x + 2}{x - 1}$       |
| 2. $\frac{x^3 + 2x + x}{x}$   | $\frac{x + 3}{5x + 2}$         |
| 3. $\frac{2 + 3b}{2}$         | 6. $\frac{3a - 1}{2a + 1} + 2$ |
| 4. $\frac{2ab + b}{3b - 4ab}$ | $\frac{2 + a}{3 - a} + 3$      |

### Exercice 4.

Simplifier les expressions suivantes :

1.  $\sqrt{9x + 9}$
2.  $\sqrt{2^5}$
3.  $\frac{1}{\sqrt{\frac{x + 2}{x - 1}}}$

### Exercice 5.

Déterminer les réels  $x$  tels que :

- |                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| 1. $ x - 2  < 3$     | 6. $ x - 2  < 5$ et $ x - 3  \leq 4$ |
| 2. $ x + 4  < -1$    | 7. $ x + 1  < 1$ ou $ x + 2  \leq 4$ |
| 3. $ x + 5  \leq 3$  | 8. $ x - 5  < 2$ et $ x + 1  \leq 1$ |
| 4. $ x + 2  \geq 5$  | 9. $ x - 2  < 4$ ou $ x + 2  \leq 2$ |
| 5. $ x + 5  \geq -1$ |                                      |

**Exercice 6.**

Soit  $a$  et  $b$  deux réels. Déterminer en fonction de  $a$  et  $b$  les réels  $\alpha$  et  $\beta$  tels que :  
 $x \in [a; b] \iff |x - \alpha| \leq \beta$ .

**Exercice 7.**

Déterminer les points  $M(x; y)$  du plan tels que :

1.  $|x + y| = 2$
2.  $|x + y| \leq 2$
3.  $|x| + |y| \leq 3$

**Exercice 8.**

Donner le domaine de définition des fonctions suivantes :

1.  $f(x) = \frac{1}{x + 2}$  ;
2.  $f(x) = \frac{\sin x}{x}$
3.  $f(x) = \sqrt{-2x + 3}$

**Exercice 9.**

Écrire les expressions ci-dessous avec la notation mathématique usuelle ( $f$  pour les fonctions et  $x$  pour la variable), puis donner le domaine de définition de chacune de ces fonctions.

1.  $H = \frac{r + \omega}{\lambda\omega(1 - \omega^2)}$  ( $H$  est appelée fonction de transfert).
2.  $z = 5t^2$  ( $z$  est la distance parcourue par une bille dans une chute libre).
3.  $P = \frac{nRT}{V}$  ( $P$  est la pression en thermodynamique).
4.  $F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1q_2}{r^2}$  ( $F$  est le champ électrostatique créé par deux charges).


**Exercice 10.**

Dans chacun des cas suivants, représenter une allure possible de la courbe sachant que :

1.  $\lim_{2^+} f = 3$ ,  $\lim_{2^-} f = -\infty$ ,  $\lim_{+\infty} f = 5$  et  $\lim_{-\infty} f = +\infty$ .
2.  $\lim_{-1^+} f = -\infty$ ,  $\lim_{-1^-} f = 0$ ,  $\lim_{-\infty} f = 0$  et  $\lim_{+\infty} f = -\infty$ .


**Exercice 11.**

Dans les exemples suivants, conjecturez les limites de  $f$ ? Expliquez pourquoi ce ne sont que des conjectures?



**Exercice 12.**

Soit  $f$  une fonction dont le graphe est le suivant :



1. Conjecturez la limite de  $f$  en 0.
2. L'expression de la fonction  $f$  est :  $f(x) = 10^{-2}(10 + x^2) \sin \frac{1 + x^2}{x}$ .  
Tracer cette fonction à l'aide de votre calculatrice. Obtenez vous la même courbe ?
3. En regardant simplement l'expression de  $f$ , donner l'allure de la représentation de  $f$  sur  $[-1; 1]$ .
4. Faire apparaître la courbe précédente sur votre calculatrice.
5. Une représentation graphique est-elle fiable pour déterminer une limite ?

**Exercice 13.** Calculer lorsqu'elles existent les limites suivantes

- |   |   |   |
|---|---|---|
| a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2 x }{x}$            | b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 2 x }{x}$          | c) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2}$  |
| d) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin^2 x}{1 + \cos x}$   | e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1+x^2}}{x}$ | f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+5} - \sqrt{x-3}$ |
| g) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x^2} - 1}{x^2}$ | h) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^n - 1}$                 |   |

**Exercice 14.**

Déterminer les limites des fonctions suivantes.

1.  $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{Rt^2 + C}{R^2\omega t^2 + C}$

2.  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{Rt^2 + C}{R^2\omega t^2 + C}$
3.  $\lim_{t \rightarrow +\infty} N_0 e^{-kt}$ .

**Exercice 15.**

Calculer les limites des grandeurs suivantes en  $a$  :

1.  $H = \frac{r + \omega}{\lambda\omega(1 - \omega^2)}$ 
  - (a) si la variable est  $\omega$  et  $a = +\infty$ , puis  $a = 1^+$ .
  - (b) si la variable est  $r$  et  $a = +\infty$ .
2.  $z = 5t^2$   $a = +\infty$
3.  $P = \frac{nRT}{V}$  la variable est  $V$  et  $a = +\infty$ , puis  $a = 0^+$ .
4.  $F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$  la variable est  $r$  et  $a = +\infty$ , puis  $a = 0^+$ .

**Exercice 16.**

Déterminer la limite des fonctions suivantes :

1.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} -2x - 3 \cos x$
2.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x + \sin x$
3.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \cos x}{x - \sin x}$

**Exercice 17.**

Dans chacun des cas, représenter une fonction vérifiant la proposition.

1.  $\exists l \in \mathbb{R} : \forall (a, b) \in \mathbb{R}^2 \exists x \in [a, b] : f(x) = l$
2.  $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2 \exists l \in \mathbb{R} \exists x \in [a, b] : f(x) = l$

**Exercice 18.**

Ecrire, à l'aide de symboles mathématiques, qu'une fonction n'admet pas de limite finie en  $+\infty$ .

**Exercice 19.**

Les fonctions suivantes sont-elles continues en  $a$  ?


1.  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{|x|}}$  pour  $x \neq 0$  et  $f(0) = 1$ , avec  $a = 0$ .
2.  $f(x) = \frac{x^2 + x - 2}{x^2 + 3x - 4}$  pour  $x \neq 1$  et  $x \neq -4$  et  $f(1) = 10$  avec  $a = 1$ .

**Exercice 20.**

Donner un exemple de fonction, différent de ceux déjà vus, admettant une limite finie en  $a$ , mais non continue en  $a$ .

**Exercice 21.**

On considère le circuit électrique ci-dessous.



Lorsque le circuit est fermé, on a  $U_c = Ee^{-\frac{t}{\tau}}$  et  $U_r = U_c$  avec  $\tau$  une constante positive.

1. Donner le domaine de définition de  $U_c$  et  $U_r$ .
2. Étudier la continuité de ces deux fonctions sur leur domaine de définition.
3. Déterminer la limite de  $U_c$  lorsque  $t$  tend vers  $+\infty$  et interpréter physiquement le résultat.

**Exercice 22.**

Étudier la possibilité de prolonger les fonctions données aux points donnés :

1.  $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$  en  $x = 2$
2.  $f(x) = \frac{x^2 - 9}{\sqrt{x + 3}}$  en  $x = -3$
3.  $f(x) = \frac{\sqrt{3x^2 + 1} - 2}{x - 1}$  en  $x = 1$

**Exercice 23.**

1. Déterminer l'image de  $]-5; 0]$  par la fonction  $f$  définie par  $f(x) = \frac{1}{x - 1}$ .
2. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'inéquation  $-3 \leq x^2 < 7$ .
3. Déterminer l'ensemble des réels  $I$  tel que  $f(I) = J$  avec la fonction  $f$  définie par  $f(x) = e^{-x^2}$  et  $J = [-2; 5]$ .

**Exercice 24.** (Facultatif)

Soit  $f$  une fonction définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Peut-on avoir  $f$  continue et  $f$  non strictement croissante sur  $[a; b]$  et  $f([a; b]) = [f(a); f(b)]$  ?
2. Peut-on avoir  $f$  non continue en  $c \in ]a; b[$  et strictement croissante sur  $[a; b]$  et  $f([a; b]) = [f(a); f(b)]$  ?
3. Énoncer la réciproque de la ligne 1 de la propriété 8.
4. Cette réciproque est-elle vraie ?

**Exercice 25.** (Facultatif)

Soit  $f$  la fonction définie par  $f(x) = (-1)^{E(x)}(x - E(x))$  où  $E(x)$  représente la partie entière de  $x$  c'est à dire le plus grand entier inférieur ou égal à  $x$ . Étudier la continuité de  $f$ .